

Ffurfiwyd cerrig lliwgar Penarth dros 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl ac maen nhw'n adrodd stori anhygoel am newidiadau i'r hinsawdd a lefel y môr. Edrychwch am ffossilau yn y cerrig bach rhydd a'r cerrig ar y traeth.

Cadwch draw oddi wrth y clogwyni gan eu bod yn ansefydlog iawn a gall cerrig gwympto ar unrhyw adeg.

004

Am ragor o ganllawiau natur neu i gysylltu â gwyddonwyr amgueddfa i gael cymorth gydag adnabod, ewch i amgueddfa.cymru/casgliadau/ar-eich-stepen-drws

Jwrasig

Haenau o gerrig calch glas/llwyd a mwd am yn ail. Wedi'u ffurfio mewn moroedd clir, cynnes, bas. Bydd mwyafrif y ffossilau wedi dod o'r gwelyau hyn.

Peidiwch morthwylio'r clogwyni, na ffossilau mewn haenau o garreg solet.



Braciopodau
Calcirhynchia
(1 i 1.5 cm)



Amonit
Schlotheimia
(hyd at 12 cm)



Cregyn deufalf
Plagiostoma
(hyd at 20 cm)



Cregyn deufalf
Liostraea
(hyd at 5 cm)



Cregyn deufalf
Chlamys
(hyd at 10 cm)



Cregyn deufalf
Cardinia
(hyd at 5 cm)

**200
miliwn o
flynyddoedd**

Cerrig llaid gwelw mewn moroedd bas a lagynau. Mae marciau tonnau bach a chraciau mwd yn gyffredin. Ychydig o ffossilau.



Dannedd ymlusgiad morol
Ichthyosaurus



Fertebr a ymlusgiad morol
Ichthyosaurus
(rhan o'r asgwrn cefn)



Tomfaen
Carthion ffosiledig ichthyosoriaid ac ymlusgiaid morol eraill.

Triasig

Roedd cerrig llaid tywyll yn cael eu dyddodi mewn moroedd bas. Ffurfiwyd Gwlâu Asgwrn yn cynnwys darnau o ffosil yn ystod stormydd garw.

Mwd gwyrdd, llwyd a choch mewn moroedd bas a lagynau. Ychydig o ffossilau.



Tonnau bach a chraciau mwd
Tystiolaeth o ddŵr bas iawn.



Eidion
Mwyn calsit ffbrog sy'n bresennol mewn siâl. Yn edrych fel cig.



Alabastr
Mwyn sy'n ffurfio drwy anweddiad mewn anialdiroedd Triasig poeth.

**215
Miliwn o
flynyddoedd**